

蜱蟲的治療與預防

什麼是蜱蟲？

蜱蟲；俗稱壁虱，扁虱，扁蝨，狗豆子等，屬於小型節肢動物，寄生於動物體表，特別活躍於澳洲東岸茂密的森林，灌木叢。棲息於野生動物，鼠類的洞穴，鳥巢等。它們寄生在寵物的體表，除了吸取寵物血液外，還同時分泌神經毒素進入寵物體內，引發寵物的神經機能障礙，呈現肌肉痙攣癱瘓，繼而衰竭死亡。

蜱蟲常被發現的部位

蜱蟲以吸血為生，會附著在寵物身體任何部位，90%的蜱蟲附著在皮膚較薄靠近頭部和頸部附近，有血管經過的體表去吸血。

寵物感染症狀

初期症狀包括虛弱，步伐不穩，輕微咳嗽或喘氣，胃口越來越差，甚至嘔吐或口吐白沫，有時或會出現叫、吠聲的改變。

寵物被蜱蟲叮咬後，可能需要一段時間才會出現上述症狀。

一旦您發現寵物身上有蜱蟲，應立即與我們聯絡安排就診。延誤診療，您的寵物可能因呼吸道麻痺導致死亡。

在家如何預防蜱蟲感染

在春夏季節，應替寵物貓咪狗狗修剪毛髮，有利您及時發現蜱蟲。

日常每天要替貓咪狗狗全身上下仔細檢查一、兩次；確定身體上沒有蜱蟲。

平時定期使用體外藥物預防。

- 貓咪：每三月使用一次 Bravecto Spot 防蟲噴劑，或使用防蟲項圈（以 Seresto 為佳）
- 狗狗：使用防蟲項圈及體外預防藥物：
 - Simparica，每月服口嚼份量一次
 - Bravecto，每三月服口嚼份量一次
 - Bravecto Spot，每六月使用一次防蟲噴劑
 - Tick collars，使用防蟲項圈，以 Seresto 為佳

雖然上述防蜱蟲藥物可以減少寵物的肌肉痙攣癱瘓，但有時也未能達到100%有效。在高危的地區，我們建議除了每天兩次替貓、狗身體檢查外，可使用 Simparica 或 Bravecto Plus 的項圈、以作預防。

發現寵物感染蜱蟲該怎麼辦

一但您的寵物貓咪狗狗感染蜱蟲，請立即做緊急處理，千萬不可遲疑觀望。

首先應該使用除蜱專用小鑷子（可以在TurrumurraVet購買）摘除貓咪狗狗身體上的蜱蟲。

摘除方式：儘量自蜱蟲口部處鉗住，如果口部斷裂滯留在貓咪狗狗皮膚中，別擔心，斷裂滯留的部分過一段時間會自行排出。注意，請勿使用煤油，茶油局部滴點在蜱蟲感染部位。

我們治療蜱毒癱瘓症方法

我們首先對病患寵物使用溫和的鎮靜劑以減少他們的焦慮感, 然後再緩慢的靜脈注射抗毒素。雖然少數病患可能會對抗毒素有過敏反應, 甚至可能導致死亡的風險, 但是我們以至少三十分鐘的緩慢速度進行靜脈注射, 將這類風險的發生機率降到最低。注射之後病患需留在醫院接受照護直到康復。

有些病患需要接受在類似保溫箱的特殊設備做氧氣治療。情況嚴重的病患, 呼吸肌可能已經受到毒素損害, 若病情持續會導致病患死亡。在這種狀況下, 病患可能需要使用重症加護設備進行人工呼吸。

術後療養

病患寵物回家後的六個星期內必須接受細心照料。由於身體虛弱, 病患更容易遭受蜱蟲感染。再次感染可能導致病患身體即速虛脫、死亡。

如果病患在同一個夏天重覆感染和癱瘓, 將會引起非常嚴重後果。

請務必每天檢查病患, 避免再次感染。

飲食

在我們建議的時間內, 病患應禁食禁水。肺炎是蜱蟲癱瘓症最明顯的副作用。

初次餵水時, 每間隔一兩個小時提供少量的飲水(碗內約0.5 - 1公分高的水量即可)。

觀察您的寵物貓咪狗狗進食和飲水是否有困難。如果你的寵物有咳嗽或吞嚥困難現象, 要立即移除飲水和食物。

不要強迫餵食或飲水, 若發現您的寵物吞嚥有困難, 請立刻與我們聯繫。

運動

病患寵物在為期6週的康復期內千萬不可運動, 即使病患看起來似乎已完全康復, 但心臟可能仍受到蜱蟲毒素影響尚未恢復。在康復期內嘗試訓練, 不但無益, 還可能危及患者的生命。

蜱蟲癱瘓症只是肌肉骨骼的損傷, 能用物理療法來幫助恢復體能。由於心臟受到毒素的損傷, 有些病患在康復期內偶爾會發生猝死的意外。激烈消耗體能的運動, 如追球; 飛盤; 慢跑; 或跟自行車後面跑步, 都可能會導致病患心臟病發。

溫度

蜱蟲毒素會使您的寵物貓咪狗狗失去自己調節體溫的能力。

寵物應留在室內調養直到康復, 並且避免溫度過熱或過冷。

排尿

有的時候蜱蟲毒素會影響膀胱的功能, 注意您的寵物可以正常排尿。如果排尿有困難, 請即刻與我們聯繫。

眼睛

每日兩次以手觸摸寵物的兩隻眼角, 檢查牠的眨眼反射動作。

癱瘓的眼皮可能會導致眼睛乾燥, 造成嚴重的眼部潰瘍, 必須使用眼藥水或眼膏直到恢復正常眨眼反射動作。

每天檢查兩次有無沾染蜱蟲!

蜱蟲無孔不入, 再仔細的檢查也仍可能有疏忽。

在醫院裏我們會在各種可能狀況下做最精密的檢查。
回到家後一定要保持日常例行檢查，尤其是在蜚蟲高風險地區。
蜚蟲絕不是只有一隻，找到一隻一定還會發現更多。

總結

一隻蜚蟲足以致寵物於死地，蜚蟲癱瘓症是急症！
如果發現您的寵物有蜚蟲癱瘓症狀，立即諮詢獸醫，切勿觀望。相較於觀望等候24
小時，病發若立即給予治療，抗毒素有效率可達九成。
未妥善處理的蜚蟲癱瘓症經常是會致命的。